

# Prävention postoperativer Wundinfektionen - Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert-Koch-Institut

Einordnung der 59 Empfehlungen  
& Feststellungen

# KRINKO Empfehlungen (April 2018)

## Bekanntmachungen – Amtliche Mitteilungen

Bundesgesundheitsbl 2018 · 61:448–473  
<https://doi.org/10.1007/s00103-018-2706-2>  
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil  
von Springer Nature 2018

## Prävention postoperativer Wundinfektionen

Empfehlung der Kommission  
für Krankenhaushygiene und  
Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert  
Koch-Institut

S. 461:

„Die Kommission **stellt fest**

(...)

Antiseptisch beschichtetes Nahtmaterial hat nur bei sehr hohen Ausgangs-SSI-Raten, bei Operationen der **Kontaminationsklassen III und IV** sowie bei **multimorbiden Patienten** einen die Infektionsgefahr reduzierenden Effekt (Kat. II)“

# 59 Empfehlungen & Feststellungen

Die Leitlinien bestehen aus 59 Empfehlungen & Feststellungen die jeweils in fünf verschiedene Kategorien (1A, 1B bis IV) eingeteilt sind.

Innerhalb der Kategorien wird unterschieden in Feststellungen & Empfehlungen.


Es gibt 44 Empfehlungen und 15 Feststellungen.


# Kategorisierungen der KRINKO

Evidenz-kategorie	Umsetzung der Empfehlung	Definition der Evidenzkategorie
IA	Unbedingt	Basierend auf gut konzipierte systematische Reviews oder einzelnen hochwertigen randomisierten kontrollierten Studien
IB	Unbedingt	Basierend auf klinischen oder hochwertigen epidemiologischen Studien und strengen, plausiblen und nachvollziehbaren theoretischen Ableitungen
II	Sollte erfolgen	Basierend auf hinweisende Studien/Untersuchungen und strengen, plausiblen und nachvollziehbaren theoretischen Ableitungen
III	Unter Umständen/ Kann	Maßnahmen, über deren Wirksamkeit nur unzureichende oder widersprüchliche Hinweise vorliegen, deshalb ist eine Empfehlung nicht möglich
IV	Unbedingt	Anforderungen, Maßnahmen und Verfahrensweisen, die durch allgemein geltende Rechtsvorschriften zu beachten sind
Bewerte klinische Praxis	Abwägung der Situation	Basierend auf klinischen Erfahrungen und Expertenmeinungen

# 59 Empfehlungen & Feststellungen der KRINKO Leitlinien Kategorisierung 1A bis IV

44 Empfehlungen & 15 Feststellungen – ohne räumliche OP Gestaltung (Räumliche OP Gestaltung sind alle Kat. II)





Johnson & Johnson Medical GmbH  
Hummelsbütteler Steindamm 71  
22851 Norderstedt  
Tel: 0800 – 267 3472 (kostenfrei)  
Tel: 0800 – 101 1638 (kostenfrei)  
[www.ethicon.com](http://www.ethicon.com)

Mai 2018 / J11P144